



Los riesgos posibles, pero poco frecuentes, incluyen:

- Reacción a los sedantes utilizados o sedación excesiva
- Puede producirse sangrado en el lugar donde se realiza la biopsia, pero generalmente es mínimo y pocas veces requiere seguimiento
- Aspirado en los pulmones del contenido del estómago
- Infección
- Complicaciones a causa de enfermedades cardíacas o pulmonares
- Perforación: un desgarro a través del revestimiento del intestino que puede requerir cirugía para reparar

A los pacientes que cancelan las intervenciones sin notificarlo al menos 48 horas antes se les restringirá el acceso a servicios futuros.

Si bien pueden ocurrir complicaciones, son poco frecuentes cuando médicos con capacitación especializada y experiencia realizan esta prueba.

Puede haber un leve dolor de garganta que puede durar alrededor de un día. Las pastillas para la garganta de tipo anestésicas de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor de garganta.

La intervención está programada para

Date

Time

- Bret Ancowitz, MD
- Thomas Dunzendorfer, MD
- Phani Molakatalla, MD

- Llegue a las _____ am/pm al centro de cirugía ambulatorio, ubicado en la entrada sur de Heywood Hospital.

- Llegue a las _____ am/pm a la unidad de corta estancia/3rd piso, ubicada en Athol Hospital.

Todas las citas están sujetas a cambio.

Conozca las directrices de su seguro

Si su seguro requiere autorización previa o una derivación del seguro, asegúrese de que nuestro consultorio la haya recibido antes de su intervención. No suponga que el consultorio de su médico de cabecera se ha encargado de esto.



EGD/Gastroscoopia Instrucciones



Heywood Gastroenterología

250 Green Street, Suite 104, Gardner, MA 01440

978-669-5522 | www.heywood.org



Antes de su intervención

14 DÍAS ANTES

- **DEJE DE TOMAR** todos los medicamentos y suplementos a base de hierbas
- Asegúrese el transporte
- Repase las instrucciones de preparación

7 DÍAS ANTES

- **NO TOME** ninguno de los siguientes medicamentos:

- Advil	- Diclofenac	- Nuprin
- Aleve	- Feldene	- Orudis
- Anaprox	- Indocin	- Relafem
- Arthrotec	- Iron	- Vitamina E
- Celebrex	- Lodine	- Voltaren
- Resfriado/ Sinusitis con ibuprofen	- Mobic	
- Daypro	- Motrin	
	- Multivitaminicos	
	- Naprosyn	

- **Llame a su médico de cabecera si:**

- Toma cumadina (Warfarina), Plavix (Clopidogrel), Aggrenox, Ticlid (Ticlopidina), Pradaxa (Dabigatrán), Effient (Prasugrel) o Brilinta (Ticagrelor)
- **Tiene diabetes**
- **Está en un tratamiento contra la artritis reumatoidea**
- Las inyecciones de Lovenox deben suspenderse 24 horas antes de la intervención
- LLAME a su médico de cabecera para recibir instrucciones sobre cómo suspender los anticoagulantes
- Llame al 978-630-5070 para preinscribirse para la intervención

▶ **No suspenda ningún medicamento recetado salvo lo anteriormente mencionados.**

1 DÍAS ANTES

- **NO tome** ningún antiácido antes de la intervención

El día de la intervención

- **NO COMA NI BEBA** nada después de la medianoche previa a la intervención
- **NADA POR BOCA**
- NO chicle ni caramelo duro
- NO fume
- Los **ÚNICOS MEDICAMENTOS** que puede tomar esa mañana son los siguientes:
 - Cardíacos (para el corazón)
 - Anticonvulsivos
 - Para la presión arterial
 - Medicamentos e inhaladores para el asma
- Traiga sus anteojos, no use lentes de contacto

- Deje las alhajas en su casa
- Traiga al hospital una lista completa de los medicamentos que está tomando actualmente

LLEGUE 1 HORA antes del horario de la intervención.

Estime 2½ horas en el hospital.

El hospital **REQUIERE** que alguien lo lleve a su casa. No puede irse en taxi, salvo que esté acompañado por un adulto responsable. No camine a casa y **NO MANEJE**.

